

# WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI)

**ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA HPAI NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD BIOASEKURACJII!!! BARDZO WAŻNE JEST, ABY:**

- **nie pić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,**
- **nie wnosić** na teren gospodarstwa **zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,**
- osoby, które w ciągu ostatnich **48 godzin** uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, powstrzymały się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- **utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,** czyli w zamknięciu lub ewentualnie na ogrodzonych i ściśle kontrolowanych wybiegach, bez dostępu do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- **przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami, dzikimi ptakami oraz ich odchodami,**
- **właściwie zabezpieczać ściółkę w sposób zabezpieczający ją przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami i ich odchodami,**
- **karmić i pić drób w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dzikimi ptakami i ich odchodami,**
- **wyłożyć maty dezynfekcyjne** przed wejściami i wyjściami z budynków, w których utrzymywany jest drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa.
- **do obsługi ptaków zawsze wykorzystywać oddzielną odzież wierzchnią i buty, w których nie wolno wychodzić poza teren obiektu, w którym znajdują się ptaki** – gdy wirus znajdzie się w gospodarstwie, może ulec dalszemu rozwleczeniu przez człowieka na butach, odzieży czy środkach transportu; trzeba pamiętać, że każda choroba charakteryzuje się tzw. „okresem inkubacji”, kiedy wirus już jest w gospodarstwie, ale ptaki, chociaż wyglądają zdrowo, wydalają już wirus do otoczenia,
- **wyposażyc gospodarstwo w zapas środków dezynfekcyjnych z dobrą datą** i przechowywać przez rok dokumentację dotyczącą ich zakupu i zużycia,
- **stosować zasady higieny osobistej-mycie rąk** przed wejściem do budynków inwentarskich – powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i detergenty skutecznie eliminują zagrożenie przeniesienia wirusa,
- **czyścić i odkażać sprzęt i narzędzia** używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

- **utrzymywać czystość wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, gdzie przechowywana jest pasza i ściółka,**
- dokonywać **codziennego przeglądu stada** i prowadzić **dokumentację** dotyczącą padnięć ptaków, pobierania paszy oraz nieśności,
- **nie wprowadzać do gospodarstwa drobiu niewiadomego pochodzenia!!!**
- **przechowywać zwłoki padłych ptaków w przeznaczonym do tego kontenerze lub pomieszczeniu,**
- **wdrożyć procedury** w zakresie zapobiegania przedostawania się dzikiego ptactwa do kurników i miejsc przechowywania paszy i ściółki oraz deratyzacji i dezynsekcji;

## **HODOWCO, INFORMUJ O PODEJRZENIU WYSTAPIENIA GRYPY PTAKÓW NA TERENIE GOSPODARSTWA!!!**

Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, Wójta, Prezydenta Miasta o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- **zwiększonej śmiertelności;**
- **spadku pobierania paszy i wody;**
- **objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;**
- **duszności;**
- **sinicy i wybroczyn;**
- **biegunki;**
- **nagłego spadku nieśności.**

**Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach**

**ul. Miedniewicka 25**

**96-100 Skierniewice**

**tel. 46 833-32-68**

**[skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl](mailto:skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl)**